

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

1. ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСА

- Клещ сидит на травинках или деревьях;
- Не может летать или прыгать;
- Может цепляться за жертву;

2. ЗАНЕСЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЖИВОТНЫМИ

- Собаки и кошки, после прогулки.

3. ЗАНЕСЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ЛЮДЬМИ

- На одежде, с цветами, ветками.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ

- Укус клеща;
- Раздавливание и втирание присосавшегося клеща;
- Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Носите в лесу специальную одежду

- Куртку или рубашку с длинными рукавами плотно плотно застегнутым воротом или закатанным;
- Головной убор;
- Высокую закрытую обувь, в которую можно заправить штаны.

2. Используйте репелленты

- Обрабатывайте одежду и открытые участки тела специальными защитными препаратами.

3. Осматривайте себя

- Не пренебрегайте само- и взаимноосмотром на привалах и по возвращению домой.

4. Пейте кипяченое молоко

- 5. **Сделайте прививку** против клещевого энцефалита!

Санбюллетень на тему: «ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА»

ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ ?

Клещевой энцефалит (синонимы – таежный энцефалит, русский весенне-летний энцефалит) – природно-очаговое, то есть, свойственное только определенным территориям заболевание вирусной этиологии с преимущественным поражением центральной нервной систе-

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА

Среда обитания: в лесах, на полях, в парках и других местах, где имеется трава и кустарники.

Активность: теплое время года, с апреля месяца по сентябрь, пик активности – май – июнь.

Как нападает клещ:

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяет со слюной анестезирующее и расслабляющее кровь вещество, обезболивающий процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепление клеща.

**ВИРУС СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ
ВСЕЙ ЖИЗНИ КЛЕЩА!**

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Инкубационный период

- Длится 1,5 – 2 недели.

2. Поражение коры головного мозга

- Длится несколько дней.

3. Воспаление головного мозга

- Симптомы : головные боли, рвота, потеря сознания (вплоть до комы), температура 39-40°C.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА

1. В первую очередь необходимо произвести удаление клеща при помощи пинцета, петли, сделанной из нитки, или специальных приспособлений. Для удаления насекомого рекомендуется выполнять его захват по возможности ближе к голове.



2. Используя медленные вращательные или колебательные движения, необходимо вытаскивать паразита в направлении перпендикулярном поверхности кожи.

3. Удаленного клеща убираем в герметичную емкость из стекла, наполненной водой для дальнейшей доставки в лабораторию.

4. Поврежденный участок кожи в месте укуса необходимо вымыть с мылом и промыть проточной водой и обработать антисептиком.

5. В случае наличия на месте поражения симптомов аллергической реакции первая помощь при укусе клеща состоит в применении антигистаминных препаратов.

